

Modelos Teóricos Contínuos

Elementos de Probabilidades e Estatística

1. Modelo Uniforme Contínuo
2. Modelo Exponencial
3. Modelo Normal

1. Modelo Uniforme Contínuo

Distribuição Uniforme Contínua

Definição (Distribuição Uniforme Contínua)

A variável aleatória contínua X diz-se ter **distribuição uniforme contínua** no intervalo (a, b) (onde $a < b$), se sua f.d.p. for dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & x \leq a \vee x \geq b \end{cases}.$$

A função de distribuição de X é dada por


$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}.$$

Notação


- $X \sim \text{Uniforme}(a, b)$
- $E(X) = \frac{a+b}{2}$
- $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

Distribuição Uniforme Contínua (cont.)

Função Densidade de Probabilidade Uniforme(2,8)



Função de Distribuição Acumulada Uniforme(2,8)



Distribuição Uniforme Contínua (cont.)

Exemplo: Uma equipa de engenheiros biomédicos está a estudar a espessura de uma camada de tecido regenerado após um procedimento de bioengenharia. As medições feitas em diferentes regiões do tecido indicam que a espessura é uniformemente distribuída entre 2 mm e 8 mm. Com base nessa informação, responda às seguintes questões:

- (a) Determine a função densidade de probabilidade (f.d.p) e a função de distribuição acumulada (f.d.) para a espessura X do tecido regenerado.
- (b) Calcule a probabilidade de que a espessura do tecido seja menor que 4 mm.
- (c) Calcule a probabilidade de que a espessura do tecido esteja entre 3 mm e 5 mm.
- (d) Determine a probabilidade de que a espessura do tecido seja maior que 7 mm.
- (e) Calcule o valor esperado e a variância da espessura X .

Distribuição Uniforme Contínua (cont.)

Resolução:

(a)

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & 2 < x < 8 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}, \quad F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 2 \\ \frac{x-2}{6}, & 2 < x < 8 \\ 1, & x \geq 8. \end{cases}$$

Distribuição Uniforme Contínua (cont.)

Resolução (cont.)

(b)

$$P(X < 4) = \int_{-\infty}^4 f_X(x) dx = \int_2^4 \frac{1}{6} dx = \left[\frac{x}{6} \right]_2^4 = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} = 0.333$$

ou

$$P(X < 4) = F_X(4) = \frac{4-2}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} = 0.333$$

Em R: `> punif(4,2,8) → [1] 0.3333`

(c)

$$P(3 < X < 5) = \int_3^5 \frac{1}{6} = \left[\frac{x}{6} \right]_3^5 = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} = 0.333$$

ou

$$P(3 < X < 5) = F_X(5) - F_X(3) = \frac{5-2}{6} - \frac{3-2}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} = 0.333$$

Em R: `> punif(5,2,8)-punif(3,2,8) → [1] 0.3333`

Distribuição Uniforme Contínua (cont.)

Resolução (cont.)

(d)

$$P(X > 7) = \int_7^{+\infty} f_X(x) dx = \int_7^8 \frac{1}{6} dx = \left[\frac{x}{6} \right]_7^8 = \frac{1}{6} = 0.166$$

ou

$$P(X > 7) = 1 - P(X \leq 7) = 1 - F_X(7) = 1 - \frac{7-2}{6} = \frac{1}{6} = 0.166$$

Em R: `> punif(7,2,8,lower.tail = FALSE) → [1] 0.1666`

(e)

$$E(X) = \frac{a+b}{2} = \frac{2+8}{2} = 5$$

$$V(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{6^2}{12} = 3$$

2. Modelo Exponencial

Distribuição Exponencial

Definição (Distribuição Exponencial)

Uma variável aleatória contínua X diz-se ter **distribuição exponencial** de parâmetro $\lambda > 0$, se a sua f.d.p. for dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}.$$

A função de distribuição de X é dada por


$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}.$$

Notação


- $X \sim \text{Exponencial}(\lambda)$
- $E(x) = \frac{1}{\lambda}$
- $V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
- É frequentemente utilizada na caracterização da duração de equipamento, modelação dos tempos entre ocorrências consecutivas de eventos do mesmo tipo, por exemplo, chegadas de clientes a um sistema, falhas mecânicas, colisões, etc.

Distribuição Exponencial (cont.)

Função Densidade de Probabilidade - Exponencial(3)



Função de Distribuição Acumulada - Exponencial(3)



Distribuição Exponencial (cont.)

Propriedade de falta de memória

Se $X \sim \text{Exponencial}(\lambda)$, então

$$P(X > t + h | X > t) = P(X > h), \quad \forall t, h \geq 0;$$

$$P(X \leq t + h | X > t) = P(X \leq h), \quad \forall t, h \geq 0.$$

Teorema

Seja X uma v.a. que representa o **número de ocorrências por unidade de tempo** (comprimento, área, etc.) de um qualquer fenómeno e Y uma outra v.a. que representa o **tempo entre as ocorrências sucessivas** (ou intervalo de tempo até a primeira ocorrência).

Se $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ então $Y \sim \text{Exponencial}(\lambda)$.

- A exponencial não é indiciada para modelar situações do tipo tempo de vida em que há desgaste ou envelhecimento.

Distribuição Exponencial (cont.)

Exemplo: Sabe-se que o intervalo de tempo médio (em horas) entre chamadas num call center é de 12 minutos e que esse tempo entre as chamadas tem distribuição exponencial.

- (a) Qual a probabilidade do intervalo de tempo ser superior a 20min?
- (b) Qual a probabilidade do intervalo de tempo ser superior a 20min e inferior a 40min?

Respostas: (a) 0.188; (b) 0.1532

Distribuição Exponencial (cont.)

Exemplo: Os geólogos estão a estudar a frequência de ocorrência de pequenos tremores de terra numa região específica. Eles observaram que, em média, ocorrem 2 pequenos tremores de terra por mês nessa região. O tempo entre esses tremores pode ser modelado por uma distribuição exponencial.

- (a) Qual é a taxa de ocorrência (λ) de pequenos tremores de terra por mês?
- (b) Qual é a função densidade de probabilidade (f.d.p.) e função de distribuição (f.d.) para o tempo X entre os tremores de terra?
- (c) Qual é a probabilidade de que o tempo entre dois tremores de terra seja inferior a 15 dias?
- (d) Qual é a probabilidade de que o tempo entre dois tremores de terra esteja entre 15 e 30 dias?
- (e) Calcule o valor esperado e a variância do tempo entre dois tremores de terra.

Distribuição Exponencial (cont.)

Resolução: (a)

Variável aleatória

X = “Tempo (em meses) entre os dois pequenos tremores”

Taxa λ

Taxa de $\lambda = 2$ tremores por mês, ou seja, temos em média $E(X) = \frac{1}{\lambda} = 0.5$ meses (ou 15 dias) por tremor.

$$X \sim \text{Exponencial}(\lambda = 2)$$

(b)

Função densidade de probabilidade de X

$$f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Função de distribuição

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Distribuição Exponencial (cont.)

Resolução (cont.):

(c)

$$P\left(X < \frac{15}{30}\right) = P(X < 0.5) = F_X(0.5) = 1 - e^{-2 \cdot 0.5} = 0.6321$$

Em R: `> pexp(0.5, 2) → [1] 0.6321206`

(d)

$$\begin{aligned} P\left(\frac{15}{30} < X < \frac{30}{30}\right) &= P(0.5 < X < 1) = F_X(1) - F_X(0.5) \\ &= 1 - e^{-2 \cdot 1} - (1 - e^{-2 \cdot 0.5}) \\ &= e^{-2 \cdot 0.5} - e^{-2 \cdot 1} \\ &= 0.2325 \end{aligned}$$

Em R: `> pexp(1, 2) - pexp(0.5, 2) → [1] 0.2325442`

Resolução (cont.):

(e)

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{2} = 0.5$$

$$V(X) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{2^2} = 0.25$$

3. Modelo Normal

Distribuição Normal

Definição (Distribuição Normal)

A variável aleatória contínua X diz-se ter **distribuição normal** de parâmetros μ e $\sigma > 0$, se sua f.d.p for dada por

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

A **função de distribuição** de X é dada por


$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt \quad x \in \mathbb{R}, \mu \in \mathbb{R}, \sigma \in \mathbb{R}^+$$

Este integral só pode ser calculado recorrendo a métodos numéricos (ou mudança de variável para $\mathbb{R}^2$).

Notação

- $X \sim N(\mu, \sigma)$
- $E(X) = \mu$
- $V(X) = \sigma^2$

Função Densidade de Probabilidade



Distribuição Normal (cont.)

Teorema (Distribuição normal reduzida)

Se $X \sim N(\mu, \sigma)$ então $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$. Z diz-se ter **distribuição normal reduzida** de parâmetros 0 e 1 com f.d.p. dada por

$$\phi(z) = f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}, \quad z \in \mathbb{R}.$$

A **função de distribuição** de Z é dada por


$$\Phi(z) = F_Z(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad z \in \mathbb{R}.$$

Esta distribuição está tabelada.


Notação

- $Z \sim N(0, 1)$
- $E(Z) = 0$
- $V(Z) = 1$
- Propriedade da simetria:
Se $Z \sim N(0, 1)$, então $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$, $\forall z \in \mathbb{R}$.

Função Densidade da Normal Padrão



Função de distribuição da Normal Padrão



Distribuição Normal (cont.)

Cálculo de Probabilidades na Distribuição Normal Padrão

- Seja $X \sim N(\mu, \sigma)$. Então $Z \sim N(0, 1)$.
- Sendo $a \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}F_X(a) &= P(X \leq a) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{a - \mu}{\sigma}\right) \\&= P\left(Z \leq \frac{a - \mu}{\sigma}\right) \\&= \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)\end{aligned}$$

- Sendo $a, b \in \mathbb{R}, a < b$

$$\begin{aligned}P(a \leq X \leq b) &= P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq \frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right) \\&= P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right) \\&= \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)\end{aligned}$$

Distribuição Normal (cont.)

Seja $X \sim N(\mu = 10, \sigma = 2)$.

$$\begin{aligned}P(X \leq 10) &= P\left(\frac{X - 10}{2} \leq \frac{10 - 10}{2}\right) \\&= P(Z \leq 0) \\&= \Phi(0) \\&= 0.5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P(X \leq 8) &= P\left(\frac{X - 10}{2} \leq \frac{8 - 10}{2}\right) \\&= P(Z \leq -1) \\&= \Phi(-1) \\&= 1 - \Phi(1) \\&= 1 - 0.8413 \\&= 0.1587\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P(X \geq 12) &= P\left(\frac{X - 10}{2} \geq \frac{12 - 10}{2}\right) \\&= P(Z \geq 1) \\&= 1 - P(Z < 1) \\&= 1 - \Phi(1) \\&= 1 - 0.8413 \\&= 0.1587\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P(X \geq 9) &= P\left(\frac{X - 10}{2} \geq \frac{9 - 10}{2}\right) \\&= P(Z \geq -0.5) \\&= 1 - P(Z < -0.5) \\&= 1 - \Phi(-0.5) \\&= 1 - (1 - \Phi(0.5)) \\&= \Phi(0.5) \\&= 0.6915\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P(8 \leq X \leq 12) &= P\left(\frac{8 - 10}{2} \leq \frac{X - 10}{2} \leq \frac{12 - 10}{2}\right) \\&= P(-1 \leq Z \leq 1) \\&= \Phi(1) - \Phi(-1) \\&= \Phi(1) - (1 - \Phi(1)) \\&= 2\Phi(1) - 1 \\&= 0.6826\end{aligned}$$

Distribuição Normal (cont.)

Exemplo: Uma equipa de físicos está a estudar a distribuição do raio de partículas subatómicas numa amostra de plasma em laboratório. Suponha que o raio dessas partículas (em femtómetros) segue uma distribuição normal com média $\mu = 0.5$ fm e desvio padrão $\sigma = 0.1$ fm.

- (a) Qual é a probabilidade de que uma partícula selecionada aleatoriamente tenha um raio inferior a 0.4 fm?
- (b) Qual é a probabilidade de que o raio de uma partícula esteja entre 0.4 fm e 0.6 fm?
- (c) Qual é a probabilidade de que o raio de uma partícula seja superior a 0.6 fm?
- (d) Se um experimento de física nuclear exige que pelo menos 95% das partículas tenham um raio superior a 0.3 fm, esta amostra de plasma é adequada para o experimento?

Respostas: (a) 0.1587; (b) 0.6826; (c) 0.1587

Distribuição Normal (cont.)

Teorema da Aditividade da Normal

Sejam $X_1, X_2, \dots, X_n$ variáveis aleatórias **independentes** com $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$. Então

$$Y = a_1X_1 + a_2X_2 + \dots + a_nX_n = \sum_{i=1}^n a_iX_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n a_i\mu_i, \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2\sigma_i^2}\right)$$

com $a_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots, n$.

Corolário

Sejam $X_1, X_2, \dots, X_n$ variáveis aleatórias **independentes e identicamente distribuídas (i.i.d)** com $X_i \sim N(\mu, \sigma)$, $i = 1, 2, \dots, n$. Então

$$T = \sum_{i=1}^n X_i \sim N(n\mu, \sqrt{n\sigma^2})$$

e

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right).$$

Exemplo: Um elevador de acesso à galeria de uma mina tem capacidade nominal de 3800kg. Admita que a v.a. X = “peso do mineiro que usa o elevador” tem distribuição normal com valor esperado 75kg e desvio padrão 8kg. Qual é a probabilidade de ser excedida a capacidade nominal do elevador quando nele se encontram 50 mineiros? Admita que o peso dos mineiros são independentes.

Resposta: 0.1886

- Manuel Cabral Morais (2020): Probabilidade e Estatística: Teoria, Exemplos & Exercícios. IST Press, 1a edição.